
Partusverslag

naam cliënte

nummer cliënte

naam partner

geboortedatum

G

P

à terme datum

amenorroeduur

bloedgroep

Rh

Hb

bij am. duur

risicogroep bij start baring

1° lijn/1° lijn met plaatsindicatie

voorgenomen plaats partus

thuis/1° lijnsinstelling/poliklinisch/onbekend

start baring

spontane weeën/spontane vliesscheur

verloskundige praktijk

naam verloskundige

stempel verloskundige praktijk



Extra aantekeningen ontsluiting

naam cliënte

datum/tijdstip initialen	observaties	onderzoek/interventies	afspraken/adviezen

Partus

plaats geboorte kind thuis/1^e lijnsinstelling/poliklinisch/ziekenhuis medische indicatie/anders

wijze geboorte spontaan/expressie/FE/VE/SC

ligging kind Aav/Aaa/kruin/aangezicht/voorhoofd/stuitligging/anders

datum/tijdstip gebroken vliezen

SROM/AROM

kleur vruchtwater helder/meconium

duur gebroken vliezen

duur actieve ontsluitingsfase (tot actief meepersen)

datum/tijdstip start persen

duur actief meepersen

Neonaat (direct postpartum)

voornaam m/v

achternaam

geboortedatum tijdstip

AS 1 min 5 min 10 min

geboortegewicht (g) p

lengte (cm)

schedelomtrek (cm)

voeding kind BV/BV+KV/KV/hypo-allergene voeding overig, namelijk:

vit. K ja/nee

congenitale afwijkingen zichtbaar nee ja, namelijk:

testis n.v.t./ links ingedaald ja/nee rechts ingedaald ja/nee

pediatrische betrokkenheid ja/nee

reden

naam cliënte

Nageboorte		Begeleiding	
datum/tijdstip geboorte placenta		continue ondersteuning vrouw ja/nee	
placenta compleet	ja/nee	3 vaten	ja/nee
vliezen compleet	ja/nee	kind aangepakt door verlosk./verlosk. in opleiding/ anders:	
wijze begeleiding nageboortetijdperk	spontaan/oxytocine + expectatief/ oxytocine + controlled traction/MPV		
bloedverlies postpartum (ml)		eindverantwoordelijke	
perineum		partusassistentie door	
gaaf/labiumruptuur perineumruptuur 1° graads/ 2° graads/ 3° graads (rectumslijmvlies intact)/ 4° graads (rectumslijmvlieslaesie)/ episiotomie		vanaf	
verdoving ja/nee		aanwezig bij partus	
medicatie(hoev.)		Consult/overdracht moeder naar 2^e - 3^e lijn	
wijze van hechten		periode verwijzing andere zorgverlener	
spierlaag: losgeknoopt/doorlopend huid: losgeknoopt hechtingen/ intracutaan		tijdens ontsluiting/tijdens uitdrijving/ postpartum	
anti D immunoglobuline		datum verwijzing	
ja/nee/n.v.t.		reden verwijzing	
		verwezen naar	

Extra aantekeningen uitdrijving/geboorte/nageboorte