

Besnijdenis

(Circumcisie)

Maatschap Chirurgie IJsselland Ziekenhuis

Inleiding

Deze folder geeft u een algemeen overzicht van de klachten en de operatie rondom de besnijdenis. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen anders is.

Wanneer vindt een besnijdenis plaats?

De medische reden om tot deze ingreep te besluiten is een vernauwing van de voorhuid van de penis. Dit is een aandoening van de voorhuid, waardoor deze niet meer over de eikel kan worden terugschoven.

Om geloofsredenen wordt vooral bij kinderen tot een besnijdenis besloten.

Vergoeding

Niet elke zorgverzekeraar vergoedt de ingreep volledig. Informeer bij uw verzekering.

De operatie

Bij kinderen vindt de ingreep doorgaans in dagbehandeling onder algehele verdoving plaats. In verband hiermee wijzen wij u op de folder over narcosevoorlichting voor kinderen die voor dagopname komen.

De ingreep kan bij volwassenen meestal onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. U krijgt over het algemeen een tweetal injecties waardoor de gehele penis tijdens de ingreep is verdoofd.

Tijdens de operatie wordt de voorhuid losgemaakt van de eikel en wordt zowel het binnen- als het buitenblad een stuk ingekort. Daarna wordt de voorhuid met oplosbare hechtingen vastgemaakt aan de rand van de eikel. Door deze ingreep komt de eikel geheel bloot te liggen.

Het is een ingreep van korte duur. Na één tot twee uur raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis weer terug.

Na de ingreep

Na de ingreep dient u nog korte tijd ter controle in het ziekenhuis te blijven op de dagverpleging.

Het is verstandig om het op de dag van de ingreep wat rustig aan te doen.

Enige pijn kunt u wel verwachten. Als pijnstiller kunt u paracetamol tabletten van 500 mg gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheker of drogist. U mag maximaal 6 tabletten van 500 mg per 24 uur gebruiken.

Het plassen kan de eerste keer een branderig gevoel geven. Het gaasje dat ter bescherming na de ingreep is aangebracht kunt u verwijderen. Als u gewoon doorplast, verdwijnt het branderige gevoel.

Kort na de ingreep ziet de penis er gezwollen en blauw/ rood uit. Ook wat vochtverlies is normaal. Dit verdwijnt in de loop van een week.

Het beste kunt u de penis omhoog leggen, richting navel.

U mag gewoon onder de douche, maar het is niet verstandig de eerste week te zwemmen.

Op de plaats van de hechtingen ontstaan korstjes, die kunnen gaan schrijnen. U heeft minder last als u het wondgebied na het douchen met vaseline insmeert.

Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de seksuele beleving. Als de wond genezen is, kunt u weer geslachts-gemeenschap hebben.

Complicaties

Gelukkig komen complicaties weinig voor.

Een complicatie, zoals een wondprobleem of een infectie, kunt u herkennen als de pijn erger wordt, als er pus of bloed uit de wond komt, als de penis steeds dikker wordt of als u meer dan 38 °C koorts heeft.

In dit geval kunt u ons bellen, van 08.00 tot 16.00 uur:

de polikliniek chirurgie, tel. 010 - 258 59 10

en van 16.00 tot 08.00 uur:

de Spoed Eisende Hulp, tel. 010 - 258 51 25.

Controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle. De hechtingen hoeven meestal niet verwijderd te worden. Ze lossen vanzelf op.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoonnummer 010 - 258 59 10.

Deze folder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (Nvvh) en aangepast voor het IJsselland Ziekenhuis. Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.