

Mediastinoscopie

Kijkoperatie naar de klieren rond de luchtpijp

Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis
Maatschap Chirurgie IJsselland Ziekenhuis

Inleiding

Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gebruikelijke gang van zaken rond een mediastinoscopie. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een mediastinoscopie?

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte, het mediastinum. Het mediastinum is het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen behalve het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten en zenuwen, ook lymfeklieren en lymfevaten.

Met behulp van deze operatie kan de specialist onderzoeken of langs de luchtpijp afwijkend weefsel of zieke lymfklieren aanwezig zijn.

De kijkoperatie

De operatie wordt verricht onder algehele narcose. Er wordt een kleine snede vlak boven het borstbeen gemaakt. Vervolgens wordt langs de voorzijde van de luchtpijp een korte buis met een lichtbron en een camera (*mediastinoscoop*) naar binnen gebracht waardoor de chirurg achter het borstbeen kan kijken.

Met behulp van fijne instrumenten worden vervolgens door de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten) uit de lymfeklieren langs de luchtpijp genomen voor microscopisch onderzoek.

Nadat de biopten zijn genomen, wordt het sneetje in de huid met hechtingen gesloten.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij de mediastinoscopie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie.

Soms ontstaat een bloeding, welke bijna altijd zonder verdere uitbreiding van de operatie verholpen kan worden. Toch is het goed te beseffen dat wanneer er iets technisch niet goed oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening, er reden kan zijn om de borstholte open te moeten maken.

Na de operatie kan rond de wond een bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze verdwijnt spontaan zonder problemen. Zelden ontstaat een infectie na deze operatie. Een enkele maal kan heesheid optreden; dit verdwijnt meestal na enkele weken.

Na de operatie

Na deze operatie heeft u niet veel pijn. Vooral de eerste dag kan er een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Al snel kunt u weer normaal eten en drinken. Wanneer er 1 tot 2 dagen na de operatie geen medische problemen zijn en uw algemene conditie het toelaat, kunt u weer snel naar huis.

Het onderzoek van de weefselmonsters duurt enige dagen (3 tot 5 dagen). Als de uitslag er is, zal de longarts en/of de chirurg die met u bespreken. Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust aan een verpleegkundige of behandelend arts.

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek.

Weer thuis

Zijn er problemen als u weer thuis bent, neem dan contact op met uw huisarts of behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of overdag telefonisch contact opnemen met:

- de polikliniek chirurgie: **010 - 258 59 10** of
- de polikliniek longziekten: **010 - 258 59 95**.

Deze folder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NvvH) en aangepast voor het IJsselland Ziekenhuis. Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.