

# **Gastroduodenoscopie**

## **Informatie voor de klinische patiënt**

Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Maatschap Gastro-enterologie IJsselland Ziekenhuis

**Datum onderzoek:** .....

## **Wat is een Gastroduodenoscopie?**

Op advies van uw behandelend arts zult u binnenkort een gastroduodenoscopie ondergaan.

Bij dit onderzoek worden uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm nauwkeurig onderzocht.

Deze organen worden bekeken met een videocameraatje dat in een lange dunne slang (de endoscoop) is ingebouwd.

Soms wordt bij dit onderzoek ook weefsel voor microscopisch onderzoek weggenomen via de scoop, maar dit is absoluut niet pijnlijk.

Het onderzoek wordt verricht door een op dit gebied ervaren specialist, die daarvoor een specifieke opleiding heeft gehad.

### **Belangrijk!**

Wanneer u antistollingsmedicijnen (Sintrom of Marcoumar) gebruikt, kan het zijn dat u dit tijdelijk moet staken.

### **De voorbereidingen**

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf middernacht (24.00 uur) niets meer mag eten of drinken.

## **Het onderzoek**

Op de dag van het onderzoek wordt u naar de endoscopie afdeling gebracht.

U ligt tijdens het onderzoek op uw linkerzijde op de onderzoekstafel. Tijdens het inbrengen van de slang via de mond, moet u een paar slikbewegingen maken en daarna alleen rustig en ontspannen zuchten.

De luchtwegen blijven tijdens het onderzoek vrij en u kunt net zo gemakkelijk ademen als anders. U krijgt het dus niet "benauwd".

Natuurlijk is het onderzoek niet prettig. Wanneer de endoscoop door de keel gaat, geeft dit een merkwaardig gevoel. Dit is echter geen pijnlijk gevoel. De keel kan worden verdoofd om de vervelende braakreflex te onderdrukken.

Vlak voor en tijdens het onderzoek krijgt u duidelijke instructies en een goede begeleiding. Een algehele narcose is voor dit onderzoek niet nodig.

Het onderzoek doet geen pijn en duurt 2 tot 5 minuten.

## **Na het onderzoek**

Als de keel verdoofd is, mag u na het onderzoek een half uur niet eten en drinken. Ook kan er een kortdurend, licht pijnlijk gevoel in de keel optreden. Dit is geen reden tot ongerustheid. De keel kan na het onderzoek wel een paar dagen gevoelig zijn.

Ook kunt u een wat opgeblazen gevoel in de buik krijgen.

De specialist die het onderzoek heeft verricht, zal u na het onderzoek kort vertellen wat hij heeft gezien.

Uw zaalarts krijgt vervolgens een uitgebreid verslag van het onderzoek en de uitslag van een eventueel weefselonderzoek na 5 dagen van het laboratorium. De zaalarts zal de consequenties van de uitslag en eventueel noodzakelijke therapie met u bespreken.

## **Heeft u nog vragen?**

Wanneer u vragen heeft over het onderzoek kunt u deze altijd aan een verpleegkundige op de afdeling stellen.

## **Meer lezen?**

Kijk voor aanbevolen websites op [www.ysl.nl](http://www.ysl.nl) bij uw specialisme.

*Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.*