

Blaasonderzoek bij kinderen

Informatie voor ouders

Afdeling Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Inleiding

Bij uw kind wordt binnenkort op de röntgenafdeling van ons ziekenhuis een blaasonderzoek verricht. In deze folder wordt informatie gegeven over de voorbereiding van het onderzoek, het onderzoek zelf en de medicatie van uw kind.

U wordt verwacht voor het onderzoek op de kinderafdeling D3.

Het onderzoek is gepland op:

..... om uur.

U wordt diezelfde dag om uur verwacht op de kinderafdeling D3, nadat u zich bij de afdeling Opname heeft gemeld.

Onderzoek urine

Twee tot drie dagen vóór het blaasonderzoek wordt altijd eerst de urine onderzocht om te kijken of deze schoon is. U levert dan wat urine van uw kind in bij de polikliniek en krijgt meteen een belafspreek voor de uitslag. Als de urine schoon is, gaat het onderzoek **in principe** door.

De urine wordt op de dag van het onderzoek nogmaals onderzocht. Als de urine schoon is, gaat het onderzoek **definitief** door.

Informatie naar uw kind toe

Het is van groot belang uw kind eerlijk en goed te informeren over het onderzoek. Uw kind heeft dan meer controle over de situatie, waardoor het minder angstig zal zijn. Probeer uw kind te vertellen wat er gaat gebeuren op een manier die past bij zijn/haar leeftijd.

Belangrijk!

- Wanneer uw kind **verkouden** is, **huiduitslag** of **koorts** heeft of **contacten met kinderziekten** heeft gehad, verzoeken wij u dit tijdig te melden aan de kinderafdeling D3 (tel. 010 – 258 54 50).
- U wordt verzocht **geen andere kinderen** mee te nemen naar het ziekenhuis.
- Als bekend is dat uw kind **allergisch** is voor **jodium**, **contrastmiddel** of **pleisters**, moet u dit van tevoren melden aan de verpleegkundige of kinderarts.
- Als u **zwanger** bent, kunt u uw kind begeleiden tijdens het gehele blaasonderzoek, maar dan moet u wel een loodschoot dragen.

Het onderzoek

Inbrengen katheter

Voor het onderzoek wordt een dun slangetje (katheter) in de plasbuis gebracht. Het inbrengen hiervan hoeft geen pijn te doen als uw kind rustig blijft en de aanwijzingen van de arts/verpleegkundige volgt: niet persen, rustig doorademen, etc. Er wordt gebruik gemaakt van een verdovend glijmiddel tijdens het inbrengen.

Inlopen contrastvloeistof

De contrastvloeistof loopt via de katheter de blaas in. Er wordt gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel.

Maken van röntgenfoto's

Nadat er voldoende contrastvloeistof in de blaas is gelopen, wordt na enige tijd (tot 15 minuten) de eerste foto gemaakt.

Uiteindelijk wordt de katheter verwijderd en worden er foto's tijdens het plassen gemaakt. Deze foto's worden, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, in liggende of staande houding gemaakt.

Na het onderzoek

De plasbuis kan door de katheter wat geïrriteerd raken. Dit kan zorgen voor lichte pijn bij het plassen. Dit kan enkele dagen duren en hoort vanzelf weer over te gaan.

Antibiotica

Uw kind krijgt over het algemeen een 'beschermend' antibioticum. Dit middel wordt overigens ook na dit onderzoek weer doorgegeven in de dosering die uw arts heeft voorgeschreven. Pas na het bekend worden van de uitslag kan worden beoordeeld of het stoppen met deze antibiotica mogelijk en verantwoord is.

Op de dag van het blaasonderzoek en de dag erna moet uw kind een hogere dosis antibiotica innemen. De dosering wordt daarbij verhoogd van 'beschermend' naar 'behandelend' om de kans op een infectie door het onderzoek zo klein mogelijk te maken.

De kinderarts beslist aan de hand van de uitslag van het blaasonderzoek of het medicijn 2 dagen na het onderzoek kan worden gestopt of doorgegeven moet worden. U hoort deze uitslag op de dag van het onderzoek of eventueel later op de polikliniek.

Als u tijdens de dagopname geen uitslag hoort, dan moet uw kind het beschermend antibioticum in elk geval blijven gebruiken tot het bezoek aan de polikliniek of de telefonische afspraak met de kinderarts.

Medicatie van uw kind

Behandelend antibioticum:

van t/m:
..... maal daags mg (= ml)

Beschermend antibioticum:

van t/m:
..... maal daags mg (= ml)

en vanaf:
..... maal daags mg (= ml)

op en:
..... maal daags mg (= ml)

Nacontrole bij uw kinderarts

De controle op de polikliniek bij de kinderarts

dr. is op

om uur.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de Polikliniek
Kindergeneeskunde.

Het telefoonnummer is: **010 - 258 59 40.**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.