

Weer naar huis na benauwdheidklachten: medicatiebeleid

Informatie voor kinderen en ouders

Afdeling Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Inleiding

Uw kind is met benauwdheidklachten opgenomen op de kinderafdeling. Wanneer uw zoon of dochter naar huis mag, krijgt u medicijnen mee. In deze folder leest u welke medicijnen dat zijn en hoe u deze gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving van de medicijnen verwijzen wij u naar de meegeleverde bijsluiters.

- **Luchtwegverwijdende medicijnen**

Deze medicijnen zijn bedoeld om de luchtwegen snel te verwijden bij een benauwdheidsaanval, waardoor de benauwdheidklachten afnemen. U hoeft dit medicijn niet te gebruiken als uw kind geen benauwdheidklachten heeft.

Voor uw kind schrijven wij het volgende medicijn voor:

- Ventolin
- Airomir

De dosering voor uw kind is:

- 6 x per dag 2 pufjes (om de 4 uur) van
.....-.....-20.... t/m-.....-20....
- 4 x per dag 2 pufjes (om de 6 uur) van
.....-.....-20.... t/m-.....-20....
- 2 x per dag 2 pufjes, ('s ochtends en 's avonds) van
.....-.....-20.... t/m-.....-20....

U kunt dit medicijn stoppen op-.....-20.... mits de klachten zijn verdwenen.

Als uw kind in de toekomst weer benauwdheidklachten krijgt, adviseren wij u om opnieuw met dit medicijn te starten. Ook als het hoesten of de verkoudheid toenemen, adviseren wij u opnieuw met de medicatie te starten.

Merkt u onvoldoende effect of heeft uw kind meer dan 6 x per dag 2 pufjes nodig?

Neem dan contact op met uw huisarts.

- **Onderhoudsmedicijnen**

Dit zijn luchtwegbeschermende medicijnen die de ontsteking in de longen remmen. Deze zijn bedoeld om in de toekomst ernstige benauwdheidsklachten te voorkomen.

Uw kind blijft dit medicijn gebruiken, ook als het niet meer benauwd is. Het is *niet* de bedoeling dat u dit medicijn vaker gaat gebruiken bij toenemende benauwdheidsklachten.

Voor uw kind schrijven wij het volgende medicijn voor:

Flixotide 125 mcg

QVar 100 mcg

De dosering voor uw kind is:

2 x per dag 1 pufje ('s ochtends en 's avonds)

2 x per dag 2 pufjes ('s ochtends en 's avonds)

- **Prednison**

Prednison is een sterke ontstekingsremmer dat bij een ernstige aanval van benauwdheid als kuur wordt gegeven.

De dosering voor uw kind is:

2 x per dag ('s ochtends en 's avonds) mg
(=.....ml) voort te zetten tot en met-.....-20.....

De luchtwegverwijdende en onderhoudsmedicijnen moeten worden gegeven via een:

Babyhaler

Volumatic

Aerochamber

Let op: gebruikt uw kind zowel luchtwegverwijdende als onderhoudsmedicijnen? Gebruik dan op de tijden dat beide medicijnen gegeven worden eerst de luchtwegverwijdende en daarna de onderhoudsmedicijnen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Polikliniek Kindergeneeskunde:
tel. **010 - 258 59 40**.

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.