

EBUS onderzoek

Echo-endoscopie

Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis

In overleg met uw behandelend specialist zult u een Ebus onderzoek ondergaan. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Wat is een Ebus ?

Ebus is de naam voor een echo-onderzoek met behulp van een flexibele slang, via uw luchtpijp. Het echoapparaat is gemonteerd in de flexibele slang (de endoscoop). Met dit onderzoek kunnen inwendige organen en lymfklieren zichtbaar worden gemaakt op een beeldscherm. Tijdens het onderzoek kunnen ook stukjes weefsel worden afgenomen voor onderzoek.

Vorbereiding op het onderzoek

Op de polikliniek longziekten, hoort u datum en tijdstip van uw onderzoek.

- U krijgt een laboratoriumformulier mee, om op dag van het onderzoek -als eerste- **bloed** te laten prikken. Dit bloedonderzoek op de dag zélf is belangrijk, omdat uw bloed niet te dun mag zijn. Zo beperken we het risico op nabloeden. Uw arts kan op dus op de dag van het onderzoek nog besluiten het onderzoek op een later tijdstip uit te voeren.
- Het is noodzakelijk dat u **nuchter** bent. Dat betekent dat u vanaf middernacht (24.00 uur) niets meer mag eten of drinken én niet meer mag roken.

- De **medicijnen** die u gewend bent in te nemen, mag u nog wel met een slokje water innemen (let op: geen bloedverdunners innemen!).
- Gebruikt u **bloedverdunners**?
Dan moet u hier tijdelijk mee stoppen.
Wanneer u moet stoppen hoort u van uw arts.
- **Inhalatie** medicatie kunt u gewoon gebruiken.
- Draag **comfortabele kleding** op de dag van het onderzoek .

Wilt u zich uiterlijk 2 uur voor het onderzoek melden bij de afdeling Opname in de hal van ons ziekenhuis?

- Een van onze gastvrouwen loopt met u mee naar verpleegafdeling D2, Dagopname.
- Op de Dagopname brengt de verpleegkundige een infuusnaald in uw hand / onderarm.
- U wordt verneveld met een luchtweg-verwijdend middel.
- Daarna wordt u naar de onderzoekskamer gebracht.
- U mag na afloop van het onderzoek niet actief deelnemen aan het verkeer. Wij verzoeken u vervoer naar huis te regelen via familie, vrienden of taxibedrijf.

Bent u al opgenomen in ons ziekenhuis?

Dan verlopen alle voorbereidingen via deze afdeling.

Het onderzoek

Om het onderzoek minder onaangenaam te maken, wordt uw keel verdoofd met een spray. Dit heeft een vieze smaak en voor uw gevoel zijn uw mond en keel gezwollen.

Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon blijven ademen.

Vlak voor het inbrengen van de scoop krijgt u via de infuusnaald een slaapmiddel toegediend. U bent wel bij bewustzijn en kunt de aanwijzingen van de arts gewoon volgen.

- Voordat het onderzoek begint zal u worden gevraagd om een eventuele gebitsprothese uit te doen.
- Tijdens het onderzoek heeft u een bijtring tussen uw kaken om de scoop te beschermen.
- Na het onderzoek krijgt u via de infuusnaald een medicijn toegediend (Anexate) om de werking van het slaapmiddel op te heffen. Het kan echter zijn dat u zich nog wel even slaperig voelt.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Het slaapmiddel Dormicum

Het slaapmiddel dat gebruikt wordt, is 'Dormicum', een kortwerkend middel dat u versuft. Eén van de eigenschappen van dit middel is dat u zich na afloop weinig of niets meer herinnert van het onderzoek en van alles wat daar omheen gebeurt. In de meeste gevallen bent u zelfs vergeten wat er **kort vóór** de toediening van het slaapmiddel is gebeurd.

Wij verzoeken u dit formulier vooraf **thuis in te vullen** en **ingevuld** mee te nemen naar uw afspraak.

Vragenlijst code lon.011 hier invoegen alvorens aan te bieden aan postkamer

Wij verzoeken u dit formulier vooraf **thuis in te vullen** en **ingevuld** mee te nemen naar uw afspraak.

De dosis wordt zo gekozen dat u suf bent, maar er is geen sprake van een narcose of een roesje. Het is dus niet uitgesloten dat u gedeeltes van het onderzoek bewust meemaakt. Het zou zelfs gevaarlijk kunnen zijn om u zover in slaap te maken dat u gegarandeerd niets bemerkt.

Het effect van het slaapmiddel is geringer bij mensen die normaal al slaapmiddelen of rustgevende medicijnen gebruiken en bij mensen die regelmatig alcohol gebruiken.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt u door de verpleegkundigen opgehaald en teruggebracht naar uw afdeling.
- Op de afdeling houden verpleegkundigen uw pols, bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed, in de gaten.
- U blijft na het onderzoek nog 2 uur nuchter. Deze tijd is nodig om uw keelverdooving uit te laten werken. Zo voorkomen we dat u zich verslikt. Hierna krijgt u iets te drinken. Als dat goed gaat mag u weer eten en drinken.
- Het is mogelijk dat u na het onderzoek last heeft van hoestprikkelers.
- Als de arts weefsel heeft weggenomen is het mogelijk dat u vers bloed bij uw sputum heeft.
- Is het onderzoek via de dagverpleging verlopen, dan mag u 2 - 3 uur na het onderzoek naar huis.

- U krijgt een afspraak mee voor de polikliniek om de uitslag van het onderzoek te bespreken met uw arts.
- Als u bloedverdunners gebruikt, krijgt u ook te horen wanneer u deze weer mag innemen. Vaak is dat 24 uur na het onderzoek. Dit hoort u voor u naar huis gaat.

Complicaties

Hoewel complicaties gelukkig zelden voorkomen, vragen wij u direct contact op te nemen met ons ziekenhuis bij:

- * Koorts: temperatuur hoger dan 38,5 graden Celsius.
- * Aanhoudende kortademigheid.
- * Bloed opgeven:
Is dit een beetje, dan is er geen reden om te schrikken en te bellen. Gaat het om 'een mondvol' dan moet u contact opnemen.
- * Aanhoudend pijnlijk gevoel in uw borstkas tijdens het hoesten.
- * Aanhoudend hoesten al dan niet in combinatie met slijm opgeven.

Door het slaapmiddel kunt u tijdelijk vergeetachtig en suf worden. Omdat het slaapmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt, mag u gedurende 24 uur geen auto rijden. Ook mag u geen machines bedienen.

Heeft u nog vragen ?

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met de polikliniek longziekten

010 – 258 5995.

Buiten kantooruren belt u 010 - 258 5000. Vraag naar de dienstdoende longarts.

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.