

Slokdarm-/maagonderzoek

Oesophagus slikfoto

Afdeling Radiologie IJsselland Ziekenhuis

Dag:

Tijdstip:

U heeft in overleg met uw arts besloten om een onderzoek van uw slokdarm (oesophagus) en/of maag met contrastmiddel te laten uitvoeren. Bij dit röntgenonderzoek zijn uw slokdarm en maag beter zichtbaar dan op gewone röntgenfoto's. Op deze manier zijn eventuele afwijkingen aan uw slokdarm en maag beter op te sporen.

Belangrijk!

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de afdeling Radiologie.

Vorbereidingen

- De dag vóór het onderzoek, vanaf 24.00 uur 's nachts tot aan het onderzoek op de volgende dag, moet u **nuchter** blijven. Dat wil zeggen dat u **niets meer mag eten en drinken en niet mag roken**.
- Als u **medicijnen** gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen, tot uiterlijk 1 uur voor het onderzoek, met een slokje water.
- Het is raadzaam uw **sieraden** thuis te laten.

Waar melden op de dag van het onderzoek?

U meldt zich bij de afdeling Radiologie (volg routenummer **50**).

Het onderzoek

Voor het onderzoek zult u gevraagd worden zich uit te kleden. Een onderbroek, sokken en een T-shirt zonder knoopjes kunt u aanhouden.

Bruiskorreltjes en contrastvloeistof

- Aan het begin van het onderzoek zal de radioloog u vragen een kleine hoeveelheid witte bruiskorreltjes door te slikken met een slokje water. Daarna vraagt de radioloog u om een

beker contrastvloeistof (= bariumpap) met kleine hoeveelheden tegelijk door te slikken.

De korreltjes en de vloeistof zorgen ervoor dat de slokdarm en de maagwand op de foto's goed zichtbaar zullen zijn.

- Door de bruiskorreltjes krijgt u een gevoel dat u moet boeren. Dit komt doordat er via de korreltjes lucht in de maag komt. Het boeren moet u tegenhouden, omdat anders de lucht weer uit de maag ontsnapt.

Röntgenfoto's

- Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een beweegbare onderzoekstafel: de tafel wordt tijdens het onderzoek op verschillende standen tussen liggend en staand ingesteld.
- U wordt verzocht om een slok bariumpap in uw mond te nemen en deze door te slikken op het moment dat de radioloog daar om vraagt.
- De radioloog zal u regelmatig vragen op uw zij, rug of buik te draaien. Dit is nodig om de pap goed over slokdarm of maag te verdelen.
- Op het moment dat de radioloog een foto maakt, moet u uw adem inhouden. Hij zal dit steeds aangeven.
- Het kan zijn dat uw maag te gespannen is om goede foto's te kunnen maken. U krijgt dan een injectie in uw arm om uw maag te ontspannen.
- Het onderzoek zal ongeveer een kwartier duren.

Na het onderzoek

- De contrastvloeistof kleurt uw ontlasting een tot twee dagen na het onderzoek wit. Daar hoeft u zich niet ongerust over te maken.
- Als u na het onderzoek veel drinkt, verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam.

Van wie krijgt u de uitslag?

De radioloog bekijkt de foto's en maakt een schriftelijk verslag van het onderzoek. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Radiologie:
010 – 258 59 75.

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.