

Röntgenonderzoek van de dunne darm

Poliklinische patiënt

Afdeling Radiologie IJsselland Ziekenhuis

Mocht u verhinderd zijn?

***Wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie
010 - 258 5975 of 010 - 258 5977***

Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte) ?

*Dan is de voorbereiding op het onderzoek bij u anders
dan beschreven op pagina 3 en 4.*

Uw voorbereiding staat beschreven in de bijlage

***Vorbereitung röntgen- onderzoek dunne darm voor
patiënten met diabetes.***

*Deze bijlage kunt u afhalen bij het loket van Radiologie of
neem contact op met de diabetesverpleegkundige,
tel. (010) 2585419*

(Bij voorkeur tussen 12.00 - 12.30 of 16.00 - 16.30 uur)

Waarom dit onderzoek?

Bij dit onderzoek brengen wij uw dunne darm in beeld. Dat gebeurt met behulp van een contrastmiddel (bariumpap) en lucht of water.

Vorbereidingen

Het is voor het onderzoek noodzakelijk dat uw darmen goed leeg en schoon zijn. Dit bereiken we door laxeermiddelen te gebruiken en veel te drinken.

Eventueel achtergebleven etensresten kunnen de beoordeling van de foto's namelijk beïnvloeden.

Let op !

- U kunt uw medicijnen blijven innemen zoals u gewend bent.
- Wanneer u overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen of röntgen contrastmiddelen, verzoeken wij u dringend dit te melden aan de arts of laborant(e).
- Als de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wilt u dit dan s.v.p. melden aan de laborant(e)?

Vorbereiding (dieet)

1 dag vóór het onderzoek

Niet toegestaan zijn:

- Koolzuurhoudende dranken en melk

Extra toegestaan zijn:

- Appelsap, druivensap, bessensap, limonadesiroop,
- Koffie en thee (met weinig suiker)
- Gezeefd sinaasappelsap, gezeefde bouillon

Houd er rekening mee dat magnesiumsulfaat en bisacodyl laxemiddelen zijn!

Voor het ontbijt	<ul style="list-style-type: none">• 1 cupje magnesiumsulfaat met een flink glas water of (gezeefd) vruchtensap• 2 tabletjes Bisacodyl <p>U kunt ontbijten zoals u dat gewend bent, maar ná het ontbijt mag u geen vast voedsel meer eten!</p>
12:00 uur	<ul style="list-style-type: none">• 1 glas limonadesiroop of gezeefde bouillon of (mineraal)water zonder koolzuur
13.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none">• Drink <u>elk uur</u> een glas (mineraal)water zonder koolzuur
17.00 uur	<ul style="list-style-type: none">• 1 cupje magnesiumsulfaat met een flink glas water of (gezeefd) vruchtensap• 2 tabletjes bisacodyl• 1 glas limonadesiroop of gezeefde bouillon
18.00 – 22.00	<ul style="list-style-type: none">• Drink <u>elk uur</u> een glas (mineraal)water zonder koolzuur
Na 22.00 uur	<ul style="list-style-type: none">• Niet meer eten, drinken of roken !!

De dag van het onderzoek

U neemt geen ontbijt en u mag tot het onderzoek niet roken.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij het loket van de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie bevindt zich op de begane grond: volg routenummer **50**.

Als uw naam afgeroepen wordt door de röntgenlaborant(e), gaat u met hem/haar mee.

De röntgenlaborante zal u vragen om u gedeeltelijk te ontkleden. U kunt alleen een ruim, lang en glad T-shirt of hemd aanhouden. Een BH mag u niet aanhouden.

- Vervolgens neemt u zittend plaats op de tafel.
- De radioloog brengt een dun slangetje via uw mond of neusholte en vervolgens via uw maag tot in het begin van uw dunne darm.
- Uw neus-keelholte wordt verdoofd met een spray. Het inbrengen van het slangetje is even een vervelend gevoel. Probeer te ontspannen terwijl u zelf het slangetje doorslikt.
- Halverwege het inbrengen van het slangetje vraagt de radioloog u te gaan liggen.
- Via het slangetje wordt contrastvloeistof in uw dunne darm gebracht. Door deze contrastvloeistof wordt uw dunne darm zichtbaar op de röntgenfoto's.

De röntgentafel waarop u ligt, beweegt tijdens het onderzoek heen en weer. De radioloog zit achter een glazen wand en kan op een monitor zien welke foto's hij of zij maakt. Via een intercom zal de radioloog u vragen van houding te veranderen. Tevens wordt er een paar keer voorzichtig op uw buik gedrukt. Dat gebeurt met een hulpstuk dat aan de röntgentafel vast zit.

Na afloop verwijdert de laborant(e) het slangetje en krijgt u op het toilet de gelegenheid zoveel mogelijk contrastvloeistof kwijt te raken.

Het onderzoek doet geen pijn maar voelt niet prettig omdat u 'aandrang' heeft.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek zult u nog wat witte pap kwijtraken bij uw ontlasting. Dat is normaal.
- Ook buikpijn kan een gevolg zijn van het onderzoek.
- Wij adviseren u veel water te drinken. Mocht u altijd al een moeilijke stoelgang hebben dan is het raadzaam na dit onderzoek een laxeermiddel in te nemen met veel water.
- Wanneer u tijdens het onderzoek Buscopan heeft gekregen, kunt u tot één uur na de injectie last hebben van slecht zien.

De uitslag

De foto's worden na het onderzoek eerst door de radioloog bekeken. Als de foto's voldoende informatie opleveren om een goede diagnose te kunnen stellen, kunt u weer naar huis. Later zal de radioloog de foto's beter bekijken en beoordelen.

U krijgt de uitslag van uw huisarts of van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Heeft u nog vragen ?

Dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met de **afdeling Radiologie : 010) 258 59 75**

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.