


Cystoscopie

Inwendig onderzoek van de blaas

Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Inleiding

Binnenkort zal bij u een cystoscopie worden uitgevoerd. Dit is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Met behulp van een cystoscoop – een dunne holle buis met verlichting – kan de binnenzijde van de blaas worden bekeken. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beiden kunnen zowel voor mannen als voor vrouwen worden gebruikt. Over het algemeen wordt de flexibele cystoscoop gebruikt.



Een cystoscopie wordt verricht als er een vermoeden bestaat op afwijkingen in plasbuis, prostaatgebied of blaas (bijvoorbeeld bij plasklachten of als u bloed heeft geplast).

Vorbereiding

- Vóór het onderzoek zal de assistente u verzoeken zo goed mogelijk uit te plassen.
- U trekt uw broek / rok en ondergoed uit in de kleedkamer.
- Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel met uw benen plat op de tafel of gespreid in speciaal hiervoor ontwikkelde beensteunen.
- De penis of schede wordt gereinigd met desinfecterende vloeistof. De benen en het onderlichaam worden met een steriele doek bedekt. Er wordt gelei ofwel op de cystoscoop ofwel in uw plasbuis gebracht. Deze gelei dient als glij- en verdovingsmiddel.
- Probeer uw spieren zo goed mogelijk te ontspannen, het inbrengen van de cystoscoop zal dan eenvoudiger en niet pijnlijk zijn.

Het onderzoek

- De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Tijdens het onderzoek wordt de blaas gevuld met steriel water. Daardoor kunt u aandrang krijgen om te plassen. De uroloog inspecteert de plasbuis, het prostaatgebied en de blaas.
- Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.
- Het steriele water waarmee de blaas gevuld werd tijdens het onderzoek kunt u hierna uitplassen.

Na het onderzoek

- U krijgt de **uitslag** meteen na afloop van het onderzoek. De uroloog bespreekt dan het resultaat van het onderzoek en de verdere gang van zaken met u.
- Daarna kunt u naar huis. Het gebruik van eigen vervoer of openbaar vervoer is geen probleem.
- U kunt de eerste uren tot enkele dagen na het onderzoek een branderig gevoel en erge aandrang bij het plassen hebben.
- U kunt wat bloed bij de urine zien. Dit kan enkele dagen duren. Dit is niet ernstig en gaat vanzelf over.
- Als u goed drinkt na het onderzoek, zullen bovengenoemde klachten vanzelf verdwijnen.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

- Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen en frequent plassen
- Bij koorts boven de 38,5°C
- Bij moeilijk of niet meer kunnen plassen

Belangrijke telefoonnummers:

Polikliniek Urologie: 010 – 258 5980
IJsselland Ziekenhuis: 010 – 258 5000
Spoedeisende Hulp: 010 – 258 5125

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met de polikliniek urologie.

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn voor het onderzoek, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie.

Het telefoonnummer is: **010 - 258 59 80**.

Afspraak

Dag en datum:dag

Tijd: uur

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.