

Retrograde urethrografie (RUG)

Onderzoek van de plasbuis

Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Inleiding

Binnenkort wordt bij u een röntgenonderzoek van uw plasbuis verricht. Dit onderzoek heet **retrograde urethrografie**.

Er wordt contrastvloeistof in uw plasbuis gespoten en vervolgens worden er röntgenfoto's gemaakt. Op de foto's is te zien of u een vernauwing in uw plasbuis heeft, hoe groot deze vernauwing is en waar deze precies zit.

Na het onderzoek kan worden besloten met welke ingreep de vernauwing in uw plasbuis behandeld moet gaan worden.

Vorbereiding thuis

Uw arts heeft antibiotica voorgeschreven voor het onderzoek. U moet hiermee de avond vóór het onderzoek starten.

Vorbereiding in het ziekenhuis

- U wordt gevraagd om zo goed mogelijk uw blaas leeg te plassen.
- U trekt uw broek uit in de kleedkamer.
- Hierna neemt u plaats op de onderzoektafel.
- Uw penis wordt schoongemaakt met desinfecterende vloeistof.

Het onderzoek

- Een speciaal instrument wordt op de uitgang van uw plasbuis "vastgemaakt".
- Hier doorheen wordt contrastvloeistof in uw plasbuis gespoten.
- Met het instrument wordt ook uw penis gestrekt zodat uw gehele plasbuis, die nu gevuld is met contrastvloeistof, afgebeeld wordt op een röntgenfoto.
- Het onderzoek duurt gemiddeld tien minuten.

Na het onderzoek

- U krijgt de uitslag meteen na afloop van het onderzoek. De uroloog bespreekt dan het resultaat van het onderzoek en de verdere gang van zaken met u.
- Daarna kunt u naar huis. Het gebruik van eigen vervoer of openbaar vervoer is geen probleem.
- U kunt de eerste uren tot enkele dagen na het onderzoek een branderig gevoel en/of erge aandrang bij het plassen hebben.
- Het is ook mogelijk dat er wat bloed in uw urine zit. Dit kan enkele dagen duren. Het is niet ernstig en gaat vanzelf over.
- Als u goed drinkt na het onderzoek, zullen bovengenoemde klachten vanzelf verdwijnen.

Wanneer moet u na het onderzoek contact opnemen met het ziekenhuis?

- Bij koorts boven de 38,5 °C.
- Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen en als u vaak moet plassen.
- Als u niet meer kunt plassen.
Als u een vernauwing van de plasbuis heeft, is het altijd mogelijk (dus ook na het onderzoek) dat u opeens niet meer kunt plassen.
Als u hiervoor naar de spoedeisende hulp gaat, meld dan aan de arts dat er een vernauwing in uw plasbuis zit en dat dus een katheter via uw penis niet wenselijk is.

Belangrijke telefoonnummers:

Polikliniek Urologie: 010 – 258 5980
IJsselland Ziekenhuis: 010 – 258 5000
Spoedeisende Hulp: 010 – 258 5125

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met de polikliniek urologie.

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn voor het onderzoek, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. Het telefoonnummer is: **010 – 258 59 80**.

Afspraak

Dag en datum:dag.....

Tijd: uur

Antibiotica starten op:

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.