


# Redenen voor verwijzing naar de gynaecoloog tijdens de bevalling




Geboortecentrum  
IJsselland



# Overdracht van zorg




**Begin zwangerschap**



**Start van de bevalling**

## Geboorte van het kind



# Verwijzing naar de gynaecoloog tijdens de bevalling

## Redenen:

- Meconium houdend vruchtwater
- Niet vorderende ontsluiting
- Verzoek voor pijnstilling
- Langdurig gebroken vliezen
- Twijfels conditie kind
- Niet vorderende uitdrijving
- Gestoord nageboorte tijdperk



# Entonox- Lachgas

- **Voordelen**

- *Kan door de eigen verloskundige gegeven worden*
- *Werkt snel/ zelf toedienen*
- *Gevoel van ontspanning*

- **Nadelen/complicaties**

- *Kinmasker / afzuigsysteem*
- *Onrustig niet continueren*
- *Maximaal 2 uur*



# Pijnstilling

## Epiduraal (ruggenprik)

- **Voordelen**
  - *Meest effectieve manier*
- **Nadelen/complicaties**
  - *Bewaking moeder en kind*
  - *Minder bewegingsvrijheid*
  - *Kans op hoofdpijn na de prik*



# Pijnstilling

## Remifentanil (Infuus met morfine)

- **Voordelen**
  - *Snel uitgewerkt*
  - *Zelf toedienen*
- **Nadelen/complicaties**
  - *Bewaking moeder en kind*
  - *Minder bewegingsvrijheid*
  - *Niet officieel geïndiceerd, wel algemeen aanvaard*



# Inleiden van de bevalling

- Waarom?
- Risico's en complicaties
- Hoe gaat het inleiden van de bevalling in zijn werk?



# Kunstverlossingen


## Vacuümextractie

- Waarom?
- Risico's en complicaties
- De vacuümextractie
- De nazorg



## Keizersnede

- Waarom?
- Risico's en complicaties
- De keizersnede
- De nazorg





# Vragen?

